

EC FERTİLİZER

Bor (B), Demir (Fe-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat)

Mikro Besin Maddeleri Karışımı

QUATRO BZnFe

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Suda Çözünür Bor (B)	: 5
Suda Çözünür Demir (Fe)	: 2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: 11

UYARILAR

Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz. Gübreleme tozlarını teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz temasında derhal bol su ile yıkayınız. Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz.

KARIŞABİLME ÖZELLİĞİ

Diğer taban gübrelere, ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte karıştırılarak kullanılabilir. Karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Direk güneş ışığı almayan serin ve kuru ortamda, + 5 ile +35 OC sıcaklıkta saklanmalıdır. Taşıma ve depolama esnasında ürünler ters çevrilmemelidir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

KULLANMA TALİMATI

Ürün	Uygulama Şekli ve Dönemi	Dozu
Tarla ve Sera Bitkileri	Fide dikimlerinde, çiçeklenme başlangıcında, 1-2 uygulama 20 -25 gün arayla	300-500 gr/da
Meyve Ağaçları	Fide dikimlerinde, hasat sonrası çiçeklenme öncesi ve sonrası, 1-2 uygulama 20 -25 gün arayla	30-150 gr/ağaç
Bağlar	Doğuştan hemen önce	1-2 kg/da
Zeytin	Hasat sonrası çiçeklenme öncesi ve sonrası	30-150 gr/ağaç
Narenciye	Hasat sonrası çiçeklenme öncesi ve sonrası	30-150 gr/ağaç
Fındık	Hasat sonrası çiçeklenme öncesi ve sonrası	100 gr/ocak
Çilek	Çiçeklenme başlangıcında, 1-2 uygulama 20 -25 gün arayla	300-500 gr/da
Patates, Havuç	Çiçeklenme başlangıcında	1-1.5 kg/da
Şeker Pancarı	Yumur oluşum döneminden önce	1-1.5 kg/da
Buğday, Arpa, Çeltik Ayçiçeği, Mısır	Kardeşlenme Dönemi öncesi	1-1.5 kg/da
Pamuk	Çiçeklenme başlangıcında	500-1000 gr/da

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :




ÜRETİCİ FİRMA

AGROQUATRO Organik Tarım San Tic. A.Ş.
Egemenlik Mahallesi 6106/15 Sk. No:13 Bornova / İzmir / Türkiye
Tel/Fax: +90 232 273 60 60
www.agroquatro.com • info@agroquatro.com

Lisans No : 1489
Tescil No : 26120
Parti/Seri No :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim Tarihinden İtibaren 5 Yıldır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.



AGROQUATRO ORG. TAR.

SAN. VE TİC. A. Ş.

Egemenlik Mah. 6106/15 Sok. No: 13
Bornova / İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 008 082 0620

**Şirket Vekili
Burak Kışın**